

LISTA 2

	SPECIE	NOME COMUNE	NOTE INTERPRETATIVE
<input type="checkbox"/>	<i>Agaricus arvensis</i>	Prataiolo	La dicitura deve essere intesa come " <i>Agaricus arvensis s.l.</i> " ossia, appartengono a questo gruppo tutte le specie del genere <i>Agaricus</i> del "gruppo degli ingiallenti" o "flavescentes" o sezione "Arvenses"; sono quindi inclusi gli <i>Agaricus</i> che ingialliscono debolmente al tocco (senza un viraggio veloce ed eclatante alla base del gambo al giallo limone) e che hanno un odore di "anice" e/o "mandorle amare" (senza odori di "inchiostro" o "fenolo"); si riporta di seguito un elenco non esaustivo delle specie che vi appartengono: <i>Agaricus arvensis</i> , <i>Agaricus silvicola</i> , <i>Agaricus essettei</i> , <i>Agaricus augustus</i> , <i>Agaricus albertii</i> , <i>Agaricus fissuratus</i> , <i>Agaricus macrocarpus</i> , <i>Agaricus nivescens</i> ⁽¹⁾
<input type="checkbox"/>	<i>Agaricus bisporus</i>	Champignon	<i>Agaricus bisporus</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Agaricus bitorquis</i>	Prataiolo	<i>Agaricus bitorquis</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Agaricus campestris</i>	Prataiolo	<i>Agaricus campestris</i>
	<i>Agaricus hortensis</i>	Champignon	<i>Agaricus bisporus</i> (denominazione corrente)
<input type="checkbox"/>	<i>Agrocybe aegerita</i>	Piopparello	<i>Agrocybe aegerita</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Amanita caesarea</i>	Ovulo buono	<i>Amanita caesarea</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Armillaria mellea</i>	Chiodino	La dicitura deve essere intesa come " <i>Armillaria mellea s.l.</i> " ossia, appartengono a questo gruppo tutte le specie del genere <i>Armillaria</i> ; si riporta di seguito un elenco delle specie che vi appartengono: <i>Armillaria mellea</i> , <i>Armillaria ostoyae</i> , <i>Armillaria gallica</i> , <i>Armillaria borealis</i> , <i>Armillaria tabescens</i> , <i>Armillaria cepistipes</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Auricularia auricula judae</i>	Orecchio di Giuda	<i>Auricularia auricula judae</i>

	SPECIE	NOME COMUNE	NOTE INTERPRETATIVE
<input type="checkbox"/>	<i>Boletus appendiculatus</i>		<i>Boletus appendiculatus</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Boletus badius</i>		<i>Xerocomus badius</i> (denominazione corrente)
<input type="checkbox"/>	<i>Boletus granulatus</i>		<i>Suillus granulatus</i> (denominazione corrente)
<input type="checkbox"/>	<i>Boletus impolitus</i>		<i>Boletus impolitus</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Boletus luteus</i>		<i>Suillus luteus</i> (denominazione corrente)
<input type="checkbox"/>	<i>Boletus regius</i>		<i>Boletus regius</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Boletus rufa</i>		<i>Leccinum aurantiacum</i> (denominazione corrente); vedere note su <i>Leccinum</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Boletus scabra</i>		<i>Leccinum scabrum</i> (denominazione corrente); vedere note su <i>Leccinum</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Clitocybe geotropa</i>	Ordinale, Agarico geotropo	<i>Clitocybe geotropa</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Clitocybe gigantea</i>		<i>Leucopaxillus giganteus</i> o <i>Leucopaxillus candidus</i> (denominazioni correnti), anche se la prima dicitura risulta essere secondo molti autori prioritaria ⁽¹⁾
<input type="checkbox"/>	<i>Craterellus cornucopioides</i>	Trombetta del morto	<i>Craterellus cornucopioides</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Hydnum repandum</i>	Steccherino dorato	La dicitura deve essere intesa come " <i>Hydnum repandum</i> s.l." ossia, appartengono a questo gruppo tutte le specie del genere <i>Hydnum</i> ; si riporta di seguito un elenco non esaustivo delle specie che lo compongono: <i>Hydnum repandum</i> e <i>Hydnum rufescens</i>

	SPECIE	NOME COMUNE	NOTE INTERPRETATIVE
<input type="checkbox"/>	<i>Lactarius deliciosus</i>	Sanguigno	La dicitura deve essere intesa come " <i>Lactarius deliciosus s.l.</i> " ossia, funghi del genere <i>Lactarius</i> appartenenti alla sezione Deliziosi (o Dapetes) comprendente tutte le specie con lattice di colore rosso-arancio; sono quindi inclusi i <i>Lactarius</i> appartenenti alle seguenti specie: <i>Lactarius deliciosus</i> , <i>Lactarius salmonicolor</i> , <i>Lactarius deterrimus</i> , <i>Lactarius vinosus</i> , <i>Lactarius sanguifluus</i> , <i>Lactarius semisanguifluus</i> , <i>Lactarius hemicyaneus</i> , <i>Lactarius quieticolor</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Leccinum</i>	Cappuccino, Alberella	La dicitura deve intendersi come " <i>Leccinum s.l.</i> " ossia, appartengono a questo gruppo tutte le specie del genere <i>Leccinum</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Lentinus edodes</i>	Shii-take	<i>Lentinus edodes</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Macrolepiota procera</i>	Ombrellone	La dicitura deve essere intesa come "funghi della specie <i>Macrolepiota procera e sue varietà</i> " ⁽²⁾
<input type="checkbox"/>	<i>Marasmius oreades</i>	Gambasecca	<i>Marasmius oreades</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Morchella</i>	Spugnola	La dicitura deve intendersi come " <i>Morchella s.l.</i> " ossia, appartengono a questo gruppo tutte le specie del genere <i>Morchella</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Pholiota mutabilis</i>	Famigliola gialla	<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (denominazione corrente)
	<i>Pholiota nameko mutabilis</i>	Nameko	<i>Kuehneromyces (Pholiota) nameko</i> e <i>Kuehneromyces (Pholiota) mutabilis</i> sono due entità separate ma simili, la prima però è di provenienza asiatica ⁽³⁾
<input type="checkbox"/>	<i>Pleurotus cornucopiae</i>	Corno dell'abbondanza	<i>Pleurotus cornucopiae</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Pleurotus eryngii</i>	Cardoncello	<i>Pleurotus eryngii</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Pleurotus ostreatus</i>	Sbrisa	<i>Pleurotus ostreatus</i>

	SPECIE	NOME COMUNE	NOTE INTERPRETATIVE
	<i>Psalliota bispora</i>	Champignon	<i>Agaricus bisporus</i> (denominazione corrente)
	<i>Psalliota hortensis</i>	Champignon	<i>Agaricus bisporus</i> (denominazione corrente)
<input type="checkbox"/>	<i>Stropharia rugosoannulata</i>	Strofaria	<i>Stropharia rugosoannulata</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Tricholoma columbetta</i>		<i>Tricholoma columbetta</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Tricholoma georgii</i>	Prugnolo, Fungo di S. Giorgio	<i>Calocybe Gambosa</i> (denominazione corrente)
<input type="checkbox"/>	<i>Tricholoma imbricatum</i>		<i>Tricholoma imbricatum</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Tricholoma portentoso</i>	Agarico portentoso	<i>Tricholoma portentosum</i> (denominazione corrente)
<input type="checkbox"/>	<i>Tricholoma terreum</i>	Moretta	La dicitura deve essere intesa come funghi " <i>Tricholoma terreum s.l.</i> " ossia, appartengono a questo gruppo tutte le specie del genere <i>Tricholoma</i> con cappello grigio feltrato-peloso, gambo fistoloso e carne bianca, privi di odore di farina; sono quindi inclusi i <i>Tricholoma</i> appartenenti alle seguenti specie: <i>Tricholoma terreum</i> , <i>Tricholoma gausapatum</i> , <i>Tricholoma myomices</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Volvariella esculenta</i>	Fungo del muschio	<i>Volvariella esculenta</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Volvariella volvacea</i>	Fungo del muschio	<i>Volvariella volvacea</i>